


Matematiikan historia 2007

Harjoitus 3 ma 29.1. 14-16 MaD 380 ,

HUOM: Tällä viikolla ei pidetä ryhmää 16-18 MaD 355. Muuten opetus jatkuu tavalliseen tapaan. Iltaryhmä kokoontuu jälleen kierroksella 4.

1. *Pythagoraan kolmikko* muodostuu kolmesta luonnollisesta luvusta, jotka voivat olla suorakulmaisen kolmion sivut. Osoita, että
 - a) jos yksi Pythagoraan kolmikun luvuista on pariton, niin toiset ovat pariton ja parillinen.
 - b) jos suurin on jaollinen neljällä, niin molemmat toisetkin ovat jaolliset neljällä.
2. Mieleisesi Boyer'n tehtävä luvusta "Euclid of Alexandria."
3. Todista Eukleideen aksioomista alkaen, että kolmion kulmien summa on kaksi suoraa kulmaa. (Aika pitkä. Katso jostakin kirjasta tai sivulta <http://www.math.jyu.fi/~kahanpaa/ETG/Eukleides.pdf> ja esitä vain lyhennelmä todistuksesta.)
4. Sofisti Hippias on keksinyt *trisektrix*- eli *kvadratrix* -nimisen käyrän, jonka yhtälö napakoordinaateissa (kulmat asteina) on $(y =) r \sin(\varphi) = \varphi$. Käyrän voi ajatella syntyvän siten, että viivoitin nousee tasaisella nopeudella neliön pohjalta neliön kanteen ja samalla toinen viivoitin kiertyy pohjalta vasemman alakulman ympäri tasaisella kulmanopeudella, joka on valittu siten, että 90 astetta saavutetaan samalla hetkellä, jolla vaakasuora viivoitin osuu kattoon. Viivoittimien leikkauskohta piirtää trisektrixin.



Konstruoi harpin, viivoittimen ja paperille annetun trisektrixin avulla säännöllinen 9-kulmio. (Saat olettaa osaavasi jakaa janan 3 yhtäsuureen osaan.)

5. Missä suhteessa kvadratrix eli trisektrix jakaa neliön pohjan? Todista väitteesi nykyaikaisin keinoin. Miten kvadratrixin avulla siis voi "neliöidä ympyrän"?
6. Mieleisesi Boyer'n tehtävä luvusta "Apollonius of Perga."
7. Todista, että taso leikkaa (suoraa ympyrä-) sylinteriä pitkin ellipsiä (tai suoraa tai ei ollenkaan). Voit matkia Apollonioksen mentelmää tai käyttää jotain modernimpaa.

KÄÄNNÄ!

8. Todista Platonin lause, jonka mukaan on olemassa tasan viisi säännöllistä monitahokasta. Neuvo: Voit käyttää seuraavaa lemmaa: ”Kussakin kärjessä tahkojen kulmien summa on enintään 360° , esimerkiksi kuutiolla 270° ”. Vaihtoehtoinen neuvo: Vetoa Eulerin (Milloinkahan hän eli, ja missä?) monitahokaslauseeseen, jonka mukaan monitahokkailla on $\#\{\text{Tahkot}\} - \#\{\text{Särmät}\} + \#\{\text{Kärjet}\} = 2$.
Kommentti: Platonin monitahokkaat olivat lähes mystisen tärkeitä harmonian ja kauneuden symboleja ja liittyvät myös tähtitieteen kehitykseen. Boyerin kirjan kansikuva! Osaatkohan todistaa Eulerin monitahokaslauseen? Voit kokeilla vaikka induktiota tahkojen lukumäärän suhteen.

